DESCONTAMINAR

APÓSITO ABSORVENTE ANTIBACTERIANO DE ALGINATO DE CÁLCIO

URGOSORB PRATA

Indicação:

Desbridamento e absorção de exsudado, feridas com gangrenas e cavitárias com risco de infecção.

- Eficácia antibacteriana sobre um largo espectro de bactérias.
- Alta capacidade de desbridamento.
- Alta absorção de exsudado.
- Cicatrização em meio húmido.
- Capacidade hemostática.
- Bem tolerado.

Urgosorb® Prata

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

TAMANHOS	U/C	C.N
10 x 10 cm	10	503134
10 x 20 cm	5	503136
Tiras 2,5 x 30 cm	5	503009

www.urgomedical.es

URGO MEDICAL

DESCONTAMINAR

APÓSITO ABSORVENTE ANTIBACTERIANO DE ALGINATO DE CÁLCIO

URGOSORB PRATA

DESCRIÇÃO

- Apósito absorvente antibacteriano de alginato de cálcio.

COMPOSIÇÃO:
Urgosorb® Prata é um apósito composto por alginato de cálcio, partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose) e um complexo de prata iónica.

APRESENTAÇÃO:
Acondicionamento individual estéril.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:
Rádio-esterilização.

PROPRIEDADES

- Os iões de prata produzem um efeito antibacteriano sobre a maioria dos microrganismos envolvidos nas infecções secundárias gram-positivos (MRSA, Staphylococcus Aureus…), gram-negativos (Pseudomonas Aeruginosa…) e leveduras.
- Em contacto com feridas exsudadas, **Urgosorb® Prata** gelifica e produz uma limpeza mais rápida.

- **Urgosorb® Prata** absorve os exsudados de feridas altamente exsudadas e mantém um meio húmido que cria condições favorecedoras do processo de cicatrização.
- **Urgosorb® Prata** absorve apenas verticalmente, sem migração lateral do exsudado. A pele perilesional é consequentemente respeitada e protegida de todos os riscos de maceração.
- **Urgosorb® Prata** gelifica-se, amolecendo e drenando os resíduos necróticos durante a granulação da necrose húmida.
- **Urgosorb® Prata** pode ser facilmente retirado, sem dor e com um só puxão.
- A elevada adaptabilidade de **Urgosorb® Prata** permite adaptá-lo instantaneamente à superfície da ferida.
- Através da activação plaquetária, **Urgosorb® Prata** favorece a hemóstase primaria de feridas sangrantes agydas e crònicas.

INDICAÇÕES

- **Urgosorb® Prata** está indicado no tratamento local de feridas exsudativas e sangrentas, com gangrenas e em estado de granulação e com risco de infecção.
- **Urgosorb® Prata Tiras** está indicado mo tratamento local de feridas cavitárias com risco de infecção.
- **Urgosorb® Prata** está contra-indicado na área endonasal em cirurgia de rinosinusite, implantes cirúrgicos, controlo de sangramento significativo e em pacientes com sensibilidade conhecida aos alginatos ou à prata.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MODO DE EMPREGO
- Limpar a ferida com soro fisiológico. Secar cuidadosamente o contorno da pele usando uma compressa estéril.
- Se se usar previamente um anti-séptico, enxaguar a ferida com soro fisiológico antes de aplicar **Urgosorb® Prata**.
- Escolher o tamanho adequado de **Urgosorb® Prata** mantendo pelo menos 1 ou 2 cm do apósito a cobrir a pele sã que rodeia a ferida.
- Aplicar **Urgosorb® Prata** directamente sobre a ferida.
- Em feridas profundas ou cavitadas (úlceras irregulares, sinus pilonidal), aplicar **Urgosorb® Prata Tiras** sem exercer excessiva pressão.
- Cobrir **Urgosorb® Prata** com um apósito secundário: duas camadas de compressas e uma ligadura ligeiramente apertada ou adesivo.
- **Urgosorb® Prata** deve ser substituído entre 1 a 3 dias, dependendo das condições da ferida.
- Em caso de úlcera de perna, **Urgosorb® Prata** pode ser humedecido com soro fisiológico com o objectivo de facilitar a sua remoção.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO:
- O tratamento com **Urgosorb® Prata** deve ser conduzido sob supervisão médica.
- Não se recomenda o seu uso concomitantemente com outros tratamentos locais.
- Na ausência de informação clínica específica, está contra-indicado o seu uso em mulheres grávidas ou em período de aleitamento, recém-nascidos e neonatos.
- Evitar o contacto com eléctrodos ou géis condutores durante medições electrónicas (EEG, ECG).
- Não usar em pacientes submetidos a exames de Ressonância Magnética.
- **Urgosorb® Prata** não deve ser usado como compressa cirúrgica para implantar, ao não ser absorvível.
- **Urgosorb® Prata** não deve ser usado nem em necroses secas nem em feridas ligeiramente exsudadas.
- A eficácia de **Urgosorb® Prata** pode ver-se comprometida pelo uso excessivo de pomadas de vaselina.
- **Urgosorb® Prata** deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade.
- Não usar se o protector de esterilidade estiver danificado.

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe III.
- Marcado CE.